

Per il Donatore

Friday 03 April 2009

Motivi e tempo di sospensione

CONSIGLI E INFORMAZIONI PER IL DONATOREI PROBLEMI PIU FREQUENTI

- uso di farmaci antiipertensivi: si consiglia di non prenderli la mattina della donazione
- assunzione di aspirina o altri analgesici: cinque giorni di sospensione per la donazione
- assunzione di antibiotici o cortisonici, o antimicotici: 15 giorni di sospensione dall'ultima somministrazione
- antibiotici e antimicotici per uso topico: nessuna sospensione
- semplice raffreddore: 3 giorni dalla totale guarigione
- influenza con sintomatologia conclamata febbrile: 1 settimana dalla completa guarigione
- laser-terapia per miopia: nessuna sospensione
- endoscopia: 4 mesi di sospensione
- SOSPENSIONE DI 48 ORE**
- donatori che abbiano effettuato le seguenti vaccinazioni: anti-epatite "B", antitifo e paratifo, antitetanica, anti-pertosse, antinfluenzale, antipolio (per iniezione), antirabbica, antidifterite, **SOSPENSIONE DI 1 MESE**
- donatori che abbiano effettuato le vaccinazioni: antimorbillo, antiparotite (orecchioni), antirosolia, anti febbre gialla, antivaaiolo, antipolio (via orale), anti tbc
- donatori sottoposti a interventi odontoiatrici
- donatori che abbiano fatto uso di sieri di origine animale **SOSPENSIONE DI 4 MESI**
- donatori che abbiano subito un intervento chirurgico di rilievo
- coloro che sono stati sottoposti ad esami endoscopici o ad uso di catetere
- chi ha ricevuto sangue o emoderivati
- chi è stato sottoposto ad agopuntura (a meno che il medico agopuntore non certifichi l'uso di aghi a perdere)
- chi è stato sottoposto a tatuaggi o piercing
- chi ha avuto rapporti sessuali occasionali, a pagamento o con soggetti tossicodipendenti
- chi è stato a contatto diretto con epatitici
- chi è stato ferito accidentalmente con una siringa o altri strumenti contaminati dal sangue
- chi è stato accidentalmente esposto ad una contaminazione delle mucose con il sangue
- **SOSPENSIONE DI 6 MESI**
- donatori che abbiano sofferto di mononucleosi (6 mesi dopo la guarigione)
- donatori che abbiano soggiornato in zone tropicali e/o malariche, sempre che durante e dopo il soggiorno non abbiano sofferto di episodi febbrili. **SOSPENSIONI DI 2 ANNI**
- donatori che abbiano sofferto di tubercolosi, osteomielite, toxoplasmosi, reumatismo articolare acuto e brucellosi possono essere ammessi alla donazione dopo due anni dalla guarigione
- **SOLO DONATRICI**
- uso della pillola anticoncezionale: nessuna sospensione delle donazioni
- dopo il parto: sospensione temporanea per 1 anno e comunque riammissione dopo cessazione allattamento al seno
- interruzione di gravidanza: sospensione temporanea per 6 mesi **NON IDONEITA' PERMANENTE**
- chi ha sofferto di malattie cardiovascolari, del sistema nervoso, tumori maligni
- chi ha tendenza ad emorragia o a crisi convulsive o svenimenti
- chi è affetto da gravi malattie gastrointestinali, renali o polmonari
- chi è stato affetto da epatite "B" o "C", HIV, malattie veneree
- chi ha fatto uso di droghe, chi è soggetto alcolista
- chi ha soggiornato in Inghilterra dal 1980 al 1996 per più di 6 mesi